

Taxon Vitis vinifera Rulandske sede

Název taxonu	Vitis vinifera Rulandske sede
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Rulandské šedé’ (RŠ)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Pinot gris, Burgunder grauer, Klevner, Burgundské šedé, Roucí šedé
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	francouzská starobylá odrůda, jde o pupenovou mutaci v rámci skupiny "Pinot" (snad z Rulandského modrého)

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle červenohnědé, dobře vyzrávajících
Pupeny	menší až středně velké, tupé
Listy	středně velké, tři až pětilaločnaté s mělkými horními výkroji, bazální výkroj je úzce otevřený nebo překrytý; povrch listu je tmavě zelený, puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý až středně velký válcovitý hrozen, hustší, kompaktní; bobule kulatá, malá až středně velká, šedočervená
Semena	středně velká, kulatá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	‘Rulandské bílé’ i ‘Rulandské modré’ (šedá barva bobulí)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře raší (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	hluboké půdy, spraše, hlinité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží, půdy s vyšším obsahem vápníku příznivě podporují tvorbu aromatických látek

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2, SO 4 či Teleki 5C

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci	středně odolná k houbovým chorobám, láká obaleče
Plodnost	středně pozdní, pravidelná (výnos 9-11 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Odrůdy	klony PO-V-2, PO-49/207, PO-67/32, PO-68/12, PO-68/28
Popis vína	plně extraktivní bílé víno, aroma po chlebové kůrce, sladkých hruškách, karamelu i medu, mívá méně kyselin
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková bílá vína, barrique

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 94)
--------------------------	--

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

