

Taxon Phedimus floriferus

Název taxonu	Phedimus floriferus
Vědecký název taxonu	Phedimus floriferus
Jména autorů, kteří taxon p...	(Praeg.) 'tHart
Český název	rozchodník květonosný
Synonyma (zahradnický pou..	Sedum floriferum Praeger
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Crassulaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Cirkumboreální oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	endemit provincie Shandong

Zařazení

Fytocenologický původ	petrofyt, phellofyt - skály a suti v pahorkatinách do 1000 m n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená
Pěstitelská skupina - pozná..	polostálozelená - stálozelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Životní forma - poznámka	přechodné typy hemikryptofyt - chamaefyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka
Zařazení podle původu, nár...	skalky, suché zídky

Popisné a identifikační znaky

Habitus	kompaktní nízce tmatá trvalka - polštářovitá v zahuštěných výsadbách
Kořen	adventivní z větvených dřevnatějících oddenků
Výhony	větvené, vystoupavé, 0.1-0.2 m, často purpurově zbarvené
Listy	střídavé, úzce lopatkovité, lysé, oddáleně pilovité, červenavě lemované
Květenství	mnohokvěté vrcholíky
Květy	aktinomorfní, heterochlamydeické s plátky při bázi lehce srůstajícími, hvězdovitě pětičetné, žluté, diplostemonické s purpurovými prašníky
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	krvavě červené měchýřky, víceméně vzpřímené
Semena	velmi drobná, cylindrická, podélně proužkovaná

Možnost záměny taxonu (+..	snadno zaměnitelné s ostatními druhy sekce Aizopsis - zejména s Phedimus kamtschaticus (Fisch.)'tHart - extrémně proměnlivý, avšak se stonky nevětvenými a listy širšími (květy s oranžovými prašníky a ploše rozloženými měchýřky), a s Phedimus middendorffianus (Maxim.)'tHart s listy téměř lineárními a květy s purpurovými prašníky
Dlouhověkost	dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)
Doba rašení - poznámka	přetrvávající vrcholové růžice na oddencích, zjara pokračuje v růstu

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec
Remontování	✓
Remontování - poznámka	příležitostně po celé léto

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	heliofyt
Faktor tepla	mrazuvzdorná do -35°C (USDA)
Faktor vody	xerofyt
Faktor půdy	propustná, pH 6.0-7.0
Faktor půdy - poznámka	propustná, kamenitá, pH 6.0-7.0

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písečné půdy bez přítomnosti Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny, A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	skalky, suché zídky, partie stepního charakteru
Doporučený spon pro výsad..	16-24 rostlin na m2

Množení

Množení	Řízkování, Vrcholové řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka	nejčastěji vrcholové řízky

Konečné hrnky 8 cm

Retardace ne

Květní tvorba dlouhodobní? - exaktní data nedostupná

Odrůdy 'Weihenstephaner Gold', ranější, na podzim bronzové olistění

Ostatní

Odkazy

- 'tHart H. & Bleij B. (2003): Phedimus. In: Eggli U., Illustrated handbook of succulent plants, Crassulaceae. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 196-203; Sieber J. (1989): Sichtung des Sedum-Sortiments/1989. Gb+Gw 89(21): 990-994; Uher J. (201

Grafické přílohy



