

Taxon Dictamnus albus

Název taxonu	Dictamnus albus
Vědecký název taxonu	Dictamnus albus
Jména autorů, kteří taxon p...	Huber
Český název	třemdava bílá
Synonyma (zahradnicky pou..	Dictamnus fraxinella Pers
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Dictamnus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Evroasijský druh - střední Evropa, střední a západní Asie, Čína; u nás roztroušeně v teých oblastech

Zařazení

Fytocenologický původ	lesostepi, stepi, světlé lesy, křoviny a háje, také na zarostlých ale slunných skalách v teplejších oblastech od nížin do pahorkatin. Často se objevuje na vápencových podkladech v kyprých půdách
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímené, úhledné trsy dorůstající výšky 50-100 cm
Kořen	oddenek bílý, obsahující alkaloid dictamnin, využíváný v léčitelství při zažívacích potížích a proti střevním parazitům
Výhony	Lodyha přímá s krátkými s měkkými chlupy, které jsou v horní části černě žláznaté
Listy	bazální listy vejčité, přisedlé, zbylé střídavé, lichospeřené, se 3-4 jarmy, sytě zelené, lesklé
Květenství	vzdušné hrozny růžové, zřídka bílé barvy
Květy	oboupohlavné, souměrné, 5-ti četné; kališní lístky jsou volné, pokryté žlázkami, měří od 5 do 20 mm a mají čárkovitě podlouhlý tvar. Korunní plátky jsou velké 20-25 mm, mají široce kopinatý tvar, růžovou (někdy bílou) barvu, jsou výrazně tmavě žilkované. Na vnější straně jsou korunní plátky opět pokryté žlázkami. Tyčinek je v květu deset, jsou do oblouku prohnuté, z květu vyčnívají směrem

	nahoru
Plody	rozpadavé tobolky, srostlé z 5-ti plodolistů. Vnitřní strana pletiva po dozrání sesychá a způsobuje vymršťování semen do svého okolí, čímž se rostlina přirozeně šíří.
Semena	hladká a černá
Vytrvalost	vytrvalá
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen
Doba kvetení - poznámka	v květu velmi atraktivní

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	teplomilný taxon, u nás zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	sucho
Faktor půdy	propustná, vápenitá půda; nesnáší těžké, zamokřené půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	krásná solitéra nebo pro menší skupiny
Použití	suchá plodenství uplatnitelná ve floristice.
Růstové i jiné druhově spec..	silně aromatická, po citronu vonící bylina; žláznatá, jedovatá, obsahuje hořčiny, alkaloidy, silice. Velmi dekorativní vzhled, pevný růst lodyh, pomalu rostoucí a velmi dlouhověká. Silně aromatická, po citronu vonící bylina; žláznatá, jedovatá, obsahuje hořčiny, alkaloidy, silice. Může vyvolávat alergické dermatologické problémy.
Doporučený spon pro výsad..	3-5 ks/m ²

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
---------	-----------------------------------

Množení - poznámka čerstvým semenem hned po dozrání. Semeno ke klíčení a zdárnému vývoji vyžaduje specifický teplotní režim. Nejdříve po dobu 6 týdnů vystavení vysokým teplotám 22° C v konstantně vlhké půdě, poté po dobu 6 – 8 týdnů vystavení nízkým teplotám (-4 až +4 °C). Dělení starých trsů na jaře je možné, ale obtížné

Odrůdy 'Albiflorus' - bíle kvetoucí, 'Purpurascens'

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Z 11: záhon 11 / ZF - Z - Akademická zahrada \(Z 11a\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... Z 11a: V/2023 - základní druh + odrůda 'Albiflorus'

Dodavatel Z 11a: Trvalky Semanín

Grafické přílohy

