

Taxon Vitis vinifera Merlan

Název taxonu	Vitis vinifera Merlan
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Merlan´ (Mer)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	XIV - 11-57
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o moldavskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Merlot´ a ´Seibel 13 666´

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavě hnědé, dobře vyzrálající
Pupeny	středně velké, tupé
Listy	středně velké, okrouhlé, bez znatelných výkrojů, bazální výkroj je úzce otevřený; povrch listu je tmavě zelený, hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý až středně velký kuželovitý hrozen, hustý; má větší kulaté bobule, modročerné barvy
Semena	malé, hruškovité, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	vhodné jsou sušší a kamenité půdy
Faktor půdy	hlinité, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA či Kober 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 nebo SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci	odolná k houbovým chorobám
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 8-13 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	víno tmavé barvy, výborné chuti po odrůdě Merlot s mírnými kabinetovými tóny
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 5, 29, 44\)](#)

