

Taxon Prunus laurocerasus ‘Etna’

Název taxonu	Prunus laurocerasus ‘Etna’
Vědecký název taxonu	Prunus laurocerasus
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	bobkovišeň lékařská
Synonyma (zahradnicky pou..	Laurocerasus officinalis M. Roem
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, Mediterránní oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Původ kultivaru: Adrian Straver, Emmerich (D) 1993, semenáč Laurocerasus officinalis 'Rotundifolia'

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	tvoří husté a široce vzpřímené středně velké keře, 1 - 2 m vysoké a 1 - 1,5 m široké
Výhony	nazelenalé
Listy	střídavé, tuhé, kožovité listy jsou nápadně bronzové, když raší, a jejich barva přechází do teplého odstínu sytě smaragdově zelené, list je od řapíku vejčitý, ale k vrcholu se rozšiřuje a končí téměř naplocho, konec je zvlněný
Květenství	hustý vzpřímený hrozen, 5–12 cm dlouhém, tvoří je velice málo
Květy	bílé, do 1 cm velké, vonné
Plody	peckovicky, v hustém hroznu, tmavě červené až černé, asi 8 mm dlouhé, kulovitě vejcovité

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Květen
Doba kvetení - poznámka	tato odrůda avšak téměř nekvete

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	vyhovují mu více stanoviště v polostínu, roste dobře i ve stínu, ovšem málo kvete, nesnáší zimní slunce, lépe snáší zimní oslunění než jiné kultivary a zůstává sytě zelená
Faktor tepla	Zóna 5 (do - 27 °C), holomrazy spojené se zimním sluncem poškozují většinou listy a omezeně nevyzrálé vrcholy výhonů
Faktor vody	prospívá na suchých až mírně vlhkých půdách
Faktor půdy	půdy kvalitní, živné, propustné, s neutrálním až mírně kyselým pH
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	na jaře odstraníme poškozené vrcholy výhonů až na zdravé dřevo, keře během května a června spolehlivě obrostou, lze tvarovat řezem
-----	--

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v průběhu celého roku
Použití	okrasný keř - solitera, skupinové výsadby, podrostové patro vyšších dřevin, volně rostoucí i tvarované živé ploty, mobilní zeleň

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky a Polovyzrálé řízky
Množení - poznámka	nejpoužívanější způsob je množení polovyzrálými až vyzrálými řízky, doporučuje se použít rovněž stimulator o 1000 - 3000 ppm IBA v talku

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	ZF - nespecifikováno / Unspecified (Stínoviště)
--------------------------	---

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2010
Odkazy	www.databaze.dendrologie.cz, http://www.openbaargroen.be , Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I (A-G). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504.

- [C. G. Davidson,](#)