

Taxon Ficus deltoidea

Název taxonu	Ficus deltoidea
Vědecký název taxonu	Ficus deltoidea
Jména autorů, kteří taxon p...	Jack (1822)
Český název	fíkovník různolistý
Synonyma (zahradnicky pou..	Ficus diversifolia Blume
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. lutescens (Desf.) Corner
Nadřazená kategorie	Ficus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše a Malesijská oblast
Biogeografické regiony - po..	Sumatra a Borneo (var. lutescens); typová varieta z Thajska po Sundy a Molukky

Zařazení

Fytocenologický původ	efylofyt, etalofyt, kremnofyt - nížinné i horské monzunové lesy do 1500 (2500) m n.m., křoviny na písčitých půdách, skály a přímořské útesy
Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem a Listnatý strom stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	v domovině epifytický, lithofytický i terestrický keř až 3 m vysoký
Kořen	allorhizní
Výhony	kompaktně zalamovaně větvené, lysé, hnědošedé, s přetrvávajícím i odlupujícím se peridermem (vždy odlupujícím se na řapících)
Listy	extrémně proměnlivé: téměř okrouhlé i téměř lineární, elipčité, obvejčité, obtrojúhlé nebo lopatkovité, temně zelené, vespod bledé s bělavou, vidličnatou i peřenou primární nervaturou (s purpurovými voskodámy žlázkami v místech větvení), řapíky s odlupující se pokožkou, palisty jen vláskovité, opadavé
Květenství	drobná, párovitě vyvíjená, stopkatá, globosní i elipčitá, vřetenovitá nebo téměř cylindrická receptakula (fíky), s vystouplými ostioly, po uzrání bledě žlutá (vždy u var. lutescens), oranžová nebo temně purpurová

Květy	drobné s masitými, načervenalými tepaly – zejména hálkové ve tvaru imerositě velmi proměnlivé
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	drobné vejčité nažky
Semena	neoddělitelná od nažek
Možnost záměny taxonu (+..	extrémně proměnlivý taxon zaměňovaný s širokolistými varietami <i>Ficus oleifolia</i> King. (větší receptakula, řapíky s přetrvávajícím peridermem); v kultivaci také s podobně olistěnými druhy africké sekce <i>Galoglychia</i> (především <i>Ficus leprieuri</i> Miq. s rovnými větévkami, drobnými a téměř přisedlými receptakuly a s purpurovou primární nervaturou bez žlázek)
Dlouhověkost	dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Únor
Konec doby kvetení	Listopad
Doba kvetení - poznámka	starší rostliny kvetou za dostatku světla celoročně (receptakula lépe vyvíjena po suché světlé periodě)

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	množení 16 klux, produkce 48-64 klux, k uchování kvality u spotřebitele nejméně 2.0-4.0 klux; pod 0.5 klux shazování listů i plodenství
Faktor tepla	20°C-24°C množení (se spodním vytápěním), poté 20°C-24°C / 20°C léte (za vyšší RVV i optimum tepot vyšší), 18°C-20°C v zimě
Faktor vody	RVV: produkce 60% a více (za vysoké vzdušné vlhkosti však nežádoucí tvorba vzdušných kořenů), prodejní haly 60%, v bytech nejméně 40%
Faktor půdy	především vzdušný a propustný substrát (hemiepifyt!); produkce zpravidla v baltské rašelině s pH 5.5-6.5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	celoročně
Choroby a škůdci	rzi (<i>Physopella</i> , <i>Cerotelium</i>) a početné deuteromycety (<i>Colletotrichum</i> , <i>Macrophoma</i> , <i>Diplodia</i> , <i>Septoria</i> , <i>Glomerella</i> , <i>Cercospora</i> , <i>Pellicularia</i> , <i>Corynespora</i>); ze škůdců svilušky (<i>Eotetranychus</i> , <i>Aceria</i>), červci (<i>Planococcus</i> , <i>Ceroastes</i> ,

Paratachardina), třešně (Gynaikotrips), molice (Singhiella, Paraleyrodes), bejlomorky (Horidiplosis), háďátka rodů Pratylenchus a Aphelenchoides

Doporučený spon pro výsad..

produkce: 6 cm množárenské hrnky 128-160 /m²; 9-10 cm mezihrnky 48-56 /m²; v konečných 12 cm hrnkách 20-28 /m²

Množení

Množení	Řízkování, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka	především vrcholové řízky s 3-5 listy - rychleji zakoření a rychleji rostou
Mezihrnky	řízky – multipack 4-6 cm, po prokoření přímo do konečných hrnků
Konečné hrnky	zpravidla hrnky 10-12 cm
Retardace	ne
Květní tvorba	nedostatečně známa – neověřována
Reakční doba	nedostatečně známa – neověřována
Doba kultivace	v 12 cm hrnkách v létě s (měsíční suchou periodou k podpoře tvorby plodenzví) šestnáct - dvacet týdnů, v zimě až 30 týdnů
Odrůdy	jen pestrolistá 'Variegata' a 'Mme.de Pandelaere' s listy převážně elipčitými, vzhledem k variabilitě však s obrovským potenciálem pro selekci nových odrůd

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník](#)

Ostatní

VBN statistiky VBN 2010: 828 tis. prod.hrnků v kategorii "Ficus overig" (2.5 mil.eur), obrat F. deltoidea nevyčíslen (VBN 2005: F. deltoidea 99 tis.hrnků s obratem 247 tis.eur; VBN 1990: 134 tis.hrnků s obratem 658 tis.Hfl)

Odkazy

- Berg C.C.& Corner E.J.H (2005): Flora Malesiana vol.17-2 Moraceae- Ficus, Nat.Herb.Nederland, Leiden; Rijn B.G.M., Hettterschied W.L.A., Likkien V.P.A. (1988): Sortiment Ficus onder de loep. Vakblad voor de Bloemisterij (91) 49: 37- 48; Stahn B.& al. (1987

Grafické přílohy



