

Taxon Vitis vinifera Aurelius

Název taxonu	Vitis vinifera Aurelius
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Aurelius’ (Au)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	NE x RR 45/18
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o českou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Neuburské’ x ‘Ryzlink Rýnský’

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	menší, tupé
Listy	středně velké až velké, výrazně pěti i vícelaločnaté se středně hlubokými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý s průsvitem; povrch listu je slabě puchýřnatý, vespod jemně plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, kuželovitý, středně hustý hrozen s křídélky; bobule kulatá, menší až středně velká, žlutozelená
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým a tupým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	Veltlínské zelené (Aurelius má na bobulích černá tečky po blizně)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody příliš vlhké, jílovité i suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy nejlépe hlinité humóznější půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední vedení
Řez snáší dobře i krátký řez na čípky, na tažnících však více plodí
Podnož na chudších půdách Kober 125 AA či CR 2, do hlubších a úrodnějších půd pak SO 4 nebo T 5C

Užitné vlastnosti

Použití bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci nízká odolnost k houbovým chorobám, citlivá zejména na plíseň šedou a láká obaleče
Plodnost pozdní, pravidelná (výnos 9-12 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Popis vína víno s výraznějšími kyselinami, prolíná se v něm výrazná květnatost aromatických a buketních látek 'Ryzlinku rýnského' s plností a extraktivností 'Neuburského'
Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková bílá vína, cuvée

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 85\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

