

Taxon Tradescantia zebrina

Název taxonu	Tradescantia zebrina
Vědecký název taxonu	Tradescantia zebrina
Jména autorů, kteří taxon p...	Hort.ex Bosse
Odrůda	‘Mme Lequesne’
Český název	podénka pruhovaná
Synonyma (zahradnický pou..	Zebrina pendula Schniz.
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	var. zebrina
Nadřazená kategorie	Tradescantia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše a Karibská oblast
Biogeografické regiony - po..	Střední Amerika: z Chiapas po Kostariku

Zařazení

Fytocenologický původ	helorgadofyt, petrochtofyt - vlhké lesy a mokravé skály od pobřeží k 1800 m n.m., často zplaňuje na druhotných stanovištích
Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem
Pěstitelská skupina - pozná..	poléhavá kobercovka (zimní zahrady, sesazované nádoby) nebo přepadavá hmkovka pro závěsné košíky, zelené stěny atd.
Životní forma	Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	plazivá (0.2 m) nebo přepadavá bylina
Kořen	adventivní zpod nodů
Výhony	poléhavé, větvené, purpurové, zelenavě skvrnkaté
Listy	střídavé, temně zelené, vespod purpurové, hrotnatě vejčité, lysé s podélnými stříbřitými pruhy (var. zebrina), pýřité (var. purpusii, var. mollipila) až vlnatě chlupaté (var. flocculosa)
Květenství	dvoustranně srůstavé vijany v člunkovitě sevřených listenech
Květy	oboupohlavné, aktinomorfní, různobalné, volnoplátéčné, trojčetné, purpurově růžové, diplostemonické
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	tobolky
Semena	elipčitá s postranními zárodky
Možnost záměny taxonu (+..	díky značné proměnlivosti (především u pýřitých variet)

zaměnitelná s řadou jiných podének nebo (nekvetoucích) s druhu typové sekce rodu Gibasis: běžně pěstované - s výjimkou Tradescantia cerinthoides Kunth (listy masité, shora lysé a vespod pýřité) a Tradescantia sillamontana Matuda (protohemikryptofyt, masité silně vlnaté listy) - kvetou však bíle

Dlouhověkost relativně krátkověká - rychle stárne, nutno zmlazovat

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Listopad
Konec doby kvetení	Duben
Doba kvetení - poznámka	příležitostně kvete celoročně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	přizpůsobivá, ale kompaktní jen za dobrého osvětlení (40-60 klux)
Faktor tepla	přizpůsobivá teplotám od 4°C do 30°C; produkce 18°C-20°C množení, poté 16°C/12°C
Faktor vody	vlhkomilná, ale značně přizpůsobivá
Faktor půdy	přizpůsobivá; produkce zpravidla v bažinaté rašelině s pH 6.0-7.0

Užité vlastnosti

Choroby a škůdci	rizi (Uromyces, Phakopsora) a početné deuteromycety (Colletotrichum, Septoria, Alternaria, Cercospora); ze škůdců klopušky (Pycnoderes), některé mandelinky (Lema, Neolema), motýli rodu Mournalia a mšice (Myzus, Rhopalosiphum), v neposlední řadě háďátka rodů Meloidogyne a Aphelenchoides
Doporučený spon pro výsad..	v zimních zahradách 4-6 rostlin na m ²

Množení

Množení	Řízkování a Vrcholové řízky
Konečné hrnky	10 cm hrnky (8-10 řízků) - 80-90 hrnků na m ² , po čtyřech týdnech rozestavení 40-50 hrnků na m ² ; také 18 cm závěsné košíky (15-25 řízků)
Retardace	chlormequat 0.2% pro sytější vybarvení a kompaktní olistění
Doba kultivace	v 10 cm hrnkách asi osm týdnů, v 18 cm koších až 14 týdnů
Odrůdy	asi půl tuctu odrůd lišících se především listovou variegací

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník](#)

Ostatní

VBN statistiky Tradescantia 2010: 430 000 prod.rostlin s prům.cenou 1.48 Euro, pozice 139. mezi hrnkovými květinami; Nejprodávanější odrůdy (T. zebrina): 'Shiny Hill', 'Violet Hill'

Odkazy

- Hunt D.R. (1986 Z): Campelia, Rhoeo and Zebrina united with Tradescantia. American Commelinaceae: XIV. Kew Bulletin 41 (2): 401-405; Stahn B., Kühn J., Kaufmann H.G. (1987): Grünpflanzen in Tabellen und Übersichten. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berl

Grafické přílohy





