

Taxon Begonia manicata

Název taxonu	Begonia manicata
Vědecký název taxonu	Begonia manicata
Jména autorů, kteří taxon p...	Brongn. ex F. Cels (1842)
Odrůda	‘Aureomaculata’
Český název	kysala
Synonyma (zahradnický pou..	Begonia lepidota Liebm.; Gireoudia manicata (Brongn. ex F. Cels) Klotzsch; Begonia robustior Standl. & L.O. Williams
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Begonia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše a Karibská oblast
Biogeografické regiony - po..	Mexiko, Guatemala

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma	Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímená stálezelená bylina vytvářející oddenky, výška 45-60 cm, šířka 30-35 cm
Výhony	vytváří oddenky
Listy	střídavé; asymetrické čepele oválné až vejčité, 12-15 x 8-12 cm, pilovité, se srdčitou bází a zvlněným ochlupeným okrajem, zelené a lesklé; listy dlouze řapíkaté; na rubu listové čepele (na žilnatině) a na řapíku vytváří výrazné ploché vínově červené chlupy, v místě nasedání čepele na řapík jsou chlupy v souvislých prstencích
Květenství	výrazné laty, vysoko nad listy
Květy	jednopohlavné, světle růžové květy o průměru 1,5 cm
Plody	3pouzdrá tobolka

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Leden
Konec doby kvetení	Březen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	rozptýlené světlo, polostín, ne na plné slunce
Faktor tepla	teplý až poloteplý skleník; teploty v létě 18-20 °C, v zimě nad 10 °C
Faktor vody	rovnoměrná zálivka, nesnáší přemokření; při teplém přezimování vyšší vzdušná vlhkost
Faktor půdy	humózní substrát s příměsí zahradní zeminy; pH 5,5 - 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	doplňkový sortiment begónií do nádob; doplněk podrostů teplých skleníků
Choroby a škůdci	třásněnky při suchém vzduchu; kořenová a listová hádátka; pravé padlí v příliš mokřém substrátu

Množení

Množení	Vegetativní, Listové řízky a Dělení trsů
Odrůdy	‘Aureomaculata’ - žluté olejové skvrny na listové čepeli, která je světle zelená a lesklá; ‘Crispa’ (syn. ‘Cristata’) - hřebenité okraje listové čepele

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/3400203?tab=references>

Grafické přílohy

