

Taxon Cordyline indivisa

Název taxonu	Cordyline indivisa
Vědecký název taxonu	Cordyline indivisa
Jména autorů, kteří taxon p...	(G. Forst.) Endl. (1836)
Český název	dračinka
Synonyma (zahradnický pou..	Dracaena indivisa G. Forst.; Terminalis indivisa (G. Forst.) Kuntze
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cordyline

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holantarktická květenná říše a Novozélandská oblast
Biogeografické regiony - po..	Nový Zéland

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Listnatý strom stálezelený a Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keře až 8 m vysoké, v kultuře 30-60(-100) cm; pomalu rostoucí
Kořen	kořeny bílé, ztlustlé
Výhony	kmínky jen málo větvené, vzpřímené a pevné
Listy	50-100 cm x 0,5-3 cm velké, úzce kopinaté, modravé, hlavní žilka vyniklá, často červená; kožovitý, mečovitý, matně zelený, s drsným okrajem, zužující se směrem k bázi; listy tvoří korunku na koncích kmínků
Květenství	latnaté květenství 60-160 cm dlouhé, řídce větvené
Květy	šestičetný, bílý až nafialovělý, nálevkovitý, do 1,5 cm, okvětní lístky po 3 ve dvou kruzích; bílé uvnitř a nafialovělé vně
Plody	8 mm velké bobule
Semena	černá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Říjen
Konec doby kvetení	Prosinec

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlé až lehce přistíněné stanoviště, bez přímého slunce
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	Celoročně teplé nad 18 °C. V létě optimální teplota 15 až 18 °C, v zimě snáší ještě dobře 4 až 7 °C (rostlina pro studený skleník).
Faktor vody	dostatečná vlhkost substrátu, ale nepřelévat; při chladném přezimování téměř bez zálivky
Faktor půdy	těžší hlinitý substrát; pH 5,8 - 6,5.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	solitérní rostliny okrasné listem pro poloteplé až chladné prostory; přes léto lze pěstovat venku, např. v historických zahradách bývá součástí parterů, dominantou v kobercových záhonech nebo jako solitéra v nádobách
Choroby a škůdci	svilušky, listové mšice

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Řízkování, Dřevité řízky, Vrcholové řízky a Osní řízky
Odrůdy	'Purpurea' - listy s purpurově bronzovým nádechem; 'Rubra' - listy tmavě bronzové

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(studený skleník\)](#)