

Taxon Ceropegia linearis

Název taxonu	Ceropegia linearis
Vědecký název taxonu	Ceropegia linearis
Jména autorů, kteří taxon p...	E. Mey. (1838)
Český název	svícník
Synonyma (zahradnický pou..	Ceropegia woodii Schltr.; Ceropegia hastata N.E. Br.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	subsp. woodii (Schltr.) H. Huber
Nadřazená kategorie	Ceropegia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Usambarská oblast, Kapská květenná říše a Kapská oblast
Biogeografické regiony - po..	jižní Afrika: Zimbabwe až východní Kapsko

Zařazení

Pěstitelská skupina	Liána, Trvalka polostálezelená a Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	sukulentní vytrvalé byliny; liány 100-200 cm dlouhé; výrazně převislý růst
Kořen	kořenová hlízka velikosti lískového oříšku
Výhony	výhony dlouhé a tenké, s uzlinami, ve kterých nasedají listy nebo se zde, v úžlabí listů, tvoří dceřinné hlízky
Listy	vstřícné; srdčitě dužnaté, až 1,5 cm dlouhé; na rubu purpurové, na lici šedozelené skvrny
Květenství	květy jednotlivě v úžlabí listů
Květy	vzpřímené; růžové až purpurově hnědé; trubkovité, nahoře otevřené a černohnědé, délky 1-2 cm
Možnost záměny taxonu (+..	Ceropegia linearis subsp. debilis (N.E. BR.) H. Huber, synonymum Ceropegia debilis N.E. BR. - významný rozdíl v tvaru listů, které jsou tenké, čárkovité

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓

Faktor světla - poznámka	světlo až lehký stín; snáší i plné slunce
Faktor tepla	teplé až poloteplé interiéry; v létě teploty 20-25 °C, v zimě při teplotě 10-12 °C
Faktor vody	na vodu nenáročná, zálivka omezená
Faktor půdy	humózní substrát s trochou zahradní zeminy a písku; pH 5,8 - 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	závěsné nádoby ve světlých a teplých interiérech
Choroby a škůdci	bez problémů

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Řízkování a Osní řízky
Množení - poznámka	na uzlinách v úžlabí listů se tvoří hlízky, které lze vysadit i s částí stonku a jedním párem listů, zakořeňují při teplotě 18-20 °C

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (teplý skleník)
--------------------------	--

Ostatní

Odkazy	http://www.tropicos.org/Name/2603297?tab=references http://www.biolib.cz/cz/taxon/id524828/
--------	--