

Taxon Hamamelis mollis

Název taxonu	Hamamelis mollis
Vědecký název taxonu	Hamamelis mollis
Jména autorů, kteří taxon p...	Oliv.
Český název	vilín měkký
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Hamamelis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Čína

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř 3-ř m vysoký, v domovině až 10 m vysoký strom
Výhony	měkce plstnaté letorosty
Pupeny	vstřícné
Listy	listy nesouměrné, nepravidelně zubaté, okrouhle vejčité až obvejčité, 8-16 cm, na bázi srdčité, na rubu plstnaté, řapík 0,5-1 cm dlouhý
Květy	květa zlatožluté, korunní lístky cca 1,5 cm dlouhé, nezvlněné
Plody	tobolka
Dlouhověkost	krátkověká dřevina

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Leden
Konec doby kvetení	Březen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	oblast I-II (III)
Faktor vody	středně vlhké půdy
Faktor půdy	půdy hlubší kvalitní, středně vlhké, kyselé
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez nesnáší řez

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	I-III - květ, vegetační sezóna - olistění, na podzim vybarvuje do žluta
Použití	solitéry blízko cesty, před tmavým pozadím lze využít brzkého kvetení a podzimního zbarvení

Množení

Množení	Hřížení a Roubování
Odrůdy	Brevipetala', velký a v mládí vzpřímený, později zakulacený a středně vzrůstný keř, kvítky jen 1 cm malé