

Taxon *Carex comans*

Název taxonu	Carex comans
Vědecký název taxonu	Carex comans
Jména autorů, kteří taxon p...	Berggr.
Odrůda	‘Bronco’
Český název	ostřice chocholatá
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Carex

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Novozélandská oblast
------------------------	----------------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	hustě trsnatá tráva, 30 cm vysoká, 30 - 40 cm široká
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	tenké dlouhé stvolky s nenápadným květenstvím
Listy	jemné, čárkovité, 30 - 40 cm dlouhé, obloukovitě ohnuté. Barva listů variabilní - nejčastěji hnědá - listy vypadají jako uschlé, ale taky světle zelená
Květenství	květenství bez estetického významu, ukryté mezi listy nebo těsně nad nimi
Plody	nažka
Možnost záměny taxonu (+..	podobná jako <i>C.buchananii</i> od které se liší menším vzrůstem a velmi širokým trsem
Dlouhověkost	krátkověká trvalka, podle podmínek stanoviště je nutné ji po 2 - 5 letech obnovovat
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	na plném slunci může být v zimě poškozena
Faktor tepla	náročná na teplo, u nás ne zcela mrazuvzdorná, vhodné na zimu přikrýt chvojím
Faktor vody	vlhké až čerstvé půdy; k sušším půdám tolerantní
Faktor půdy	propustná, kamenitá i hlinitopísčité půda
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - vápnostřežný	✓
Faktor půdy - poznámka	nemá vyhraněné požadavky

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	celoročně
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), A - Alpinum, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	solitera nebo menší skupiny - nechat vyniknout velmi jemnou texturu, obloukovitou strukturu a zajímavou barvu listu
Použití	ideální pro tvorbu detailu; širšímu použití brání nedostatečná mrazuvzdornost.
Růstové i jiné druhově spec..	listy na jaře neseřezávat, pouze vytrhat zaschlé; špatně obráží
Doporučený spon pro výsad..	5 - 7 ks/m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	snadné množení ze semen a ne zcela uspokojivá mrazuvzdornost způsobují, že taxon může být někdy používán jako letnička. Pro výsadby spolu s letničkami množíme z výsevů v VII - VIII předešlého roku.
Odrůdy	V nabídce formy s hnědým listem (např. 'Bronze' - také uváděna pod názvem 'Bronze Form' nebo se zeleným listem 'Amazon Mist' . Odrůda 'Frosted Curls', často uváděná náleží k Carex albuda, odrůda 'Bronzita' k Carex fragellifera.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [C 1: záhon vpravo od hlavního vchodu / ZF - C - Výsadby v okolí budovy C \(záhon C6 - odrody 'Bronco', 'Amazon Mist'\)](#)
- [R: pozemky bývalého učiliště / ZF - R - Rozvojová plocha \(záhon SK 29 \(u plotu\)\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2012

Výsev/výsadba na stanoviš... výsev na jaře 2012 ze semen, výsadba na podzim

Dodavatel Černý

Grafické přílohy

