

Taxon Iris reticulata

Název taxonu	Iris reticulata
Vědecký název taxonu	Iris reticulata
Jména autorů, kteří taxon p...	M. Bieb.
Odrůda	‘Joyce’
Český název	kosatec síťkovaný
Synonyma (zahradnický pou..	Iridodictyum reticulatum (M.Bieb.) Rodion.
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Iris

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	Turecko, Sýrie, Libanon, Izrael, Irák, Írán, Kavkaz. V Evropě se začal pěstovat již na začátku 19. století.

Zařazení

Pěstitelská skupina	Hlíznatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	Cibulky se vysazují v říjnu do hloubky 5-8 cm na teplé slunné místo, půda musí být dobře propustná. V době vegetačního klidu vyžadují cibulky suché prostředí, ve vlhčích polohách a těžších půdách je vhodné cibulky v červnu vyjmout z půdy a do další výsadby je skladovat na suchém místě. V dobrých podmínkách mohou cibulky zůstat na stanovišti několik let. Vytvoří pak působivé trsy. Tyto druhy kosatců patří na jaře k prvním kvetoucím rostlinám v zahradě. Vysazují se tedy na dobře viditelná místa v blízkosti cest, na skalky a do trvalkových záhonů nebo do větších nádob.

Popisné a identifikační znaky

Kořen	Kořeny svazčité
Pupeny	Pupeny jsou umístěny na podpučí cibule.
Listy	Listy tmavě zelené, ojínné, čárkovité a dlouhé až 30 cm. Lista se začínají prodlužovat až po odkvětu.
Květy	Květy v odstínech modré a fialové barvy vykvétají v únoru až březnu a slabě voní.
Plody	Plodem je tobolka.

Vytřvalost	Na vhodných stanovištích dobře vytřvalý.
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben
Remontování - poznámka	Neremontuje.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci	V našich podmínkách netrpí chorobami ani škůdci.
Doporučený spon pro výsad..	15 x 15 cm.

Množení

Množení - poznámka	Rostliny se množí dceřinými cibulkami.
Odrůdy	Dnes je v kultuře velké množství odrůd, lišících se především barvou a šířkou květních plátků, např. 'Joyce', 'Edward' s jasně modrými květy, bílým žilkováním a žlutou skvrnou na vnějších plátcích; 'Pauline', 'Purple Gem' s modrofialovými květy s bílým žíháním; 'Natascha' s květy bílými se žlutou skvrnou, 'Cantab', 'Marquerite' se světle modrými květy, bílým žilkováním a žlutou skvrnou na vnějších plátcích, 'J.S.Dijt' s tmavě fialovými květy, bílým žilkováním a žlutou skvrnou na vnějších plátcích; 'Gordon' s tmavě modrými květy, bílým žilkováním a žlutou skvrnou na vnějších plátcích a mnohé další. Pěstují se také odrůdy, vzniklé mezidruhovým křížením, např. 'Frank Elder', 'Katharine Hodgkin' či 'Sheila ann German' jejichž rodiči jsou I. histrioides (G.F.Wilson) S.Am. 'Major' a I. winogradowii Fomin. Mají světle modré květy s výrazným modrým žilkováním a žlutou skvrnou na vnějších plátcích. Křížení mezi I. histrioides (G.F.Wilson) S.Am. a I. reticulata M.Bieb. dalo vzniknout odrůdám 'Violet Beauty', 'George', 'Harmony'.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 31: štěrkový záhon / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(O31: 'Joyce', J. S. Dijt'\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... D 10: 'J. S. Dijt' - podzim 2015 - jaro 2023 přesazený za skleník do štěrkového záhonku (O 31)

Dodavatel D 10: 'J. S. Dijt' - Jošt Import

Grafické přílohy



