

Taxon Vitis vinifera Prachtraube

Název taxonu	Vitis vinifera Prachtraube
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Prachtraube’ (Pr)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Prachtraube, Raisin superbe
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	starší evropská odrůda vzniklá v Alsaském Colmaru, křížením odrůd ‘Boskokisi (Boskolena)’ x ‘Madlenka královská’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle žlutavě hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké až velké, tupé
Listy	středně velké, tři až pětilaločné, s velmi výraznými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený; povrch listu je puchýřnatý, vespod jemně plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký, kuželovitý, středně hustý hrozen s křídélky; bobule kulatá až elipsovitá, středně velká, zelenožlutá
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	‘Müller Thurgau’ (Prachtraube nemá tak hluboké listové výkroje)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost střední až dobrá
Faktor vody	příliš vlhké, jílovité i suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	nejlépe hlinitopísčité humóznější půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	snáší dobře i krátký řez na čípky, na tažných však více plodí
Podnož	pro vyšší tvary do sušších podmínek bujněji rostoucí podnože Kober 125 AA i 5 BB; do hlubších humóznějších půd SO 4, CR 2 i T 5C

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda (dřívě i stolní) - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	střední odolnost k houbovým chorobám, citlivá k plísni šedé
Plodnost	ranější, pravidelná (výnos 7-12 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je masitá až chruplavá, příjemně sladké chuti; víno je ovocné lehčí s jemnou kyselinkou
Doporučená technologie vína	burčák, stolní a jakostní vína

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 132)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

