

Taxon Corylus colurna

Název taxonu	Corylus colurna
Vědecký název taxonu	Corylus colurna
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	líška turecká
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Corylus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast a Iránsko-turanská oblast
------------------------	--

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně rychle rostoucí strom 15- 20 m vysoký, koruna v mládí kuželovitá, později vejčitá koruna s pravidelným okrajem
Výhony	letorosty jsou žlutohnědé, žlaznatě chlupaté, později brázdité, korkovité
Pupeny	střídavé, vejčité, zelenavě hnědé,s červenavě pýřitými šupinami
Listy	široce vejčité, na bázi srdčité, lesklé, tmavě zelené, na rubu jen na žilnatině chlupaté, 2x pilovité nebo drobně laločnaté, řapík 2-3 cm dlouhý
Květenství	jehnědy
Květy	jednodomé, jednopohlavné, samčí jehnědy 6-12 cm dlouhé
Plody	Po 2-8 kusech, obal roztřepený, otevřený, žláznatý, téměř k bázi členěný v čárkovité zprohýbané cípy; oříšky kulovité 1,5-2,0 cm dlouhé
Kůra a borka	v mládí korkovitá béžová borka, později rozpraskaná, odlupčivá okrouhlých šupinách

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	kvete před rašením listů
-------------------------	--------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
------------------------	---

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	snáší zástín
Faktor tepla	teplomilná, oblasti I-II
Faktor vody	svědčí jí čerstvě vlhké půdy, suchovzdomná dřevina
Faktor půdy	humózní živné půdy

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití	solitéra, okraje skupin, porosty, aleje
Růstové i jiné druhově spec..	strom s pravidelnou korunou, někdy až stmulou; zajímavé plod, list nebarví výrazně

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Hřížení a Roubování
Množení - poznámka	stromkové tvary se roubují na C. columna
Odrůdy	Granat ´ - listy na mladých výhonech intenzivně tmavě červenohnědé, na rubu vínové; později na líci matně tmavě zelené, na rubu jsou červené jen nervy a řapík; ´Te-Terra Red´ - koruna kuželovitá, vzpřímená; listy velké, purpurové

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Slovácká - Valtická / Zámecký park v Lednici](#)