

Taxon Codiaeum variegatum

Název taxonu	Codiaeum variegatum
Vědecký název taxonu	Codiaeum variegatum
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Rumph. ex A. Juss. (1824)
Odrůda	‘President’
Český název	kroton
Synonyma (zahradnický pou..	Codiaeum variegatum (L.) Blume; Codiaeum variegatum var. pictum (Lodd.) Müll. Arg.; Croton pictus Lodd.; Croton variegatus L.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Codiaeum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Indická oblast, Indočínská oblast a Malesijská oblast
Biogeografické regiony - po..	Indie, Srí Lanka, Malajské souostroví, Sundské ostrovy

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Listnatý strom stálezelený a Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stálezelený, vzpřímený, chudě větvený a lysý keř či malý stromek, výška 1-2(-5) m
Výhony	lysé, s vyniklými listovými jizvami, listnaté kmínky 3-10 cm tlusté; palisty chybí
Listy	střídavé; (tence) kožovité, lesklé, velmi proměnlivé ve velikosti a tvaru, zbarvené červeně, růžově, oranžově, purpurově nebo žlutě, vejčité až čárkovité, (vejčitě) podlouhlé, eliptické nebo lopatkovité či obvejčitě podlouhlé, celokrajné nebo laločnaté, 5-35 x 0,5-10 cm velké, řapíky 1-3,5 cm, báze klínovitá, špičatá nebo tupá
Květenství	úžlabní hrozen, 8-40 cm dlouhý, obvykle vzpřímený, lysý; rostlina jednodomá
Květy	samčí květy bílé - 5 volných kališních lístků, 5 volných korunních lístků, které jsou poněkud kratší než kalich, 20-30 tyčinek; samičí květy žlutavé - 5 na bázi srostlých kališních lístků, koruna chybí, gyneceum srůstá ze 3 plodolistů, blizna je trojlaločná

Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	tobolky téměř kulovité, mírně zploštělé, lysé, asi 9 mm v průměru
Semena	semena asi 6 mm
Dlouhověkost	ano

Nároky na stanoviště

Faktor světla	celoročně velmi světlé, bez přímého slunce
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	teplý skleník či interiér; v létě 18-25 °C; v zimě 16-18 °C, při nižších teplotách shazuje listy, nesnáší poklesy teploty pod 10 °C; chránit před průvanem a chladem od kořenů
Faktor vody	pravidelná a rovnoměrná zálivka, nesnese dlouhodobě vyschlý substrát
Faktor půdy	humózní substrát s trochou zahradní zeminy; pH 5,0 - 6,0

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	výrazná barevná solitéra v bytech; rovněž využíván lidovým léčitelstvím, mimo jiné jako prostředek k zastavení krvácivosti
Choroby a škůdci	vlnatky, puklice, třásněnky, při suchém vzduchu svilušky
Růstové i jiné druhově spec..	rostlina vytváří bezbarvý latex; jedovatá

Množení

Množení	Vegetativní, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka	kultivary s výrazně barevnými listy většinou nekvetou a množí se výhradně vegetativně: vrcholové řízky - teplota substrátu 25-30 °C, vysoká vzdušná vlhkost; stonkové řízky se 3-4 listy
Odrůdy	pěstuje se mnoho kultivarů odlišných zbarvením listů, např.: 'Veitchii'; 'Punctatum Aureum' - výrazná žlutá kresba listů; 'Aucobefolium'; 'Goldfinger' - úzké, žlutě panašované listy, atd.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Poznámka také známý pod názvem podivec pestrý

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/12805421?tab=references>
- <http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=14682>

Grafické přílohy





