

Taxon *Hoya carnosa*

Název taxonu	Hoya carnosa
Vědecký název taxonu	Hoya carnosa
Jména autorů, kteří taxon p...	(L. f.) R. Br. (1810)
Český název	voskovka masitá
Synonyma (zahradnický pou..	Asclepias carnosa L. f.; Schollia carnosa (L. f.) Schrank ex Steud.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Hoya

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Čínsko-japonská oblast, Paleotropická květenná říše, Indočínská oblast, Malesijská oblast, Malesijská oblast, Australská květenná říše a Eremejská oblast (střední Austrálie)
Biogeografické regiony - po..	střední a jihovýchodní Čína, Indie, Barma, Viet nam, Malajsie, Austrálie: Queensland

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Interiérová rostlina okrasná květem a Liána stálezelená
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	sukulentní popínavý (ovíjivý) keř, až 6 m, lysý s výjimkou květenství
Kořen	ztlustlý
Výhony	s dlouhými internódií, po celé délce v nódech kořenující
Listy	vstřícné; řapíky dlouhé 1–1,5 cm, čepel široce vejčitě srdčitá nebo vejčitě podlouhlá až eliptická, 3,5–13 × 3–5 cm velká, báze zaoblená až mělce srdčitá, vrcholek tupý až krátce protažený, asi 4 páry žilek; list voskově lesklý a masitý
Květenství	kulovitý a hustý terminální nebo axilární okolík, asi 30květý, pýřitý
Květy	5četné voskové vonné květy, stopky květů 2–4 cm, koruna porcelánově bílá, s růžovým středem, kolovitá, má 1,5–2 cm v průměru, laloky trojúhlé
Plody	čárkovitě kopinaté, 6–10 × 0.5–1.5 cm velké
Semena	semena asi 5 × 1 mm
Dlouhověkost	výrazně dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Duben

Konec doby kvetení Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - polostín ✓

Faktor světla - poznámka plné slunce (nutné pro kvetení) až lehký stín; ve velkém stínu nekvete

Faktor tepla teplý až poloteplý skleník či interiér; přes léto 18-20 °C v zimě 10-15 °C

Faktor vody stejnoměrná mírná vlhkost substrátu; rosení; v zimním období zálivka omezená; přihnojování mírné, jinak bujně rostou a málo kvetou

Faktor půdy propustný, humózní substrát s přidavkem písku; nízká frekvence přesazování; pH 5,8 - 6,5

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického... leden - prosinec

Použití popínavé nebo převislé rostliny pro světlé místnosti do závěsných nádob, okraje sesazovaných nádob, vertikální konstrukce; vhodné pro hydroponii

Choroby a škůdci červci, mšice nebo svilušky při příliš teplém přezimování; opad listů v důsledku nadměrné vlhkosti; při přemokření hniloba kořenů

Množení

Množení Vegetativní, Vrcholové řízky a Osní řízky

Odrůdy Alba' - květy čistě bílé; 'Compacta' - silně zprohýbané až zvlněné listy, krátká internodia; 'Exotica' - listy žlutě a růžově pestré, okraj zelený; 'Picta' - listy s krémově bílým okrajem; 'Variegata' - listy žlutobíle skvrnitě s červenými okraji; var. carnosá - listy tmavozelené, nejsou tečkované nebo pruhované; semeníky lysé; var. gushanica - listy svrchu hustě nebo řidče stříbřitě tečkované; semeníky drobně pýřité; 'Holliana' - velmi malé vícebarevné lístky délky 2 - 3cm a šířky 1,5cm; velmi pomalu rostoucí voskovka;

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/2601477?tab=chromosomecounts>