

Taxon Aconitum carmichaeli

Název taxonu	Aconitum carmichaeli
Vědecký název taxonu	Aconitum carmichaelii
Jména autorů, kteří taxon p...	Debx.
Český název	oměj Carmichelův
Synonyma (zahradnický pou..	Aconitum fischeri Forb.et Hemsel.non Rchb.
Autor	Věra Žďárská (v_ra_rsk_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Aconitum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Mongolsko, Korea, Čína, Kamčatka

Zařazení

Fytocenologický původ	okraje lesních porostů, travnaté stráně, od nížin do 200 m n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující a Léčivá a kořeninová rostlina
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímená, trsnatá trvalka výšky kolem 80 - 150 (200) cm
Kořen	kořenová hlíza tmavě hnědé barvy a kónického tvaru
Výhony	vzpřímené, řidce chlupaté, spoře větvené
Listy	střídavé, kožovité, dlanitodílné až dlanitosečné, okrouhlé, 3 dílné 6-11 x 9-15 cm velké, na lici řidce přitiskle chlupaté, na rubu řidce chlupaté.
Květenství	vrcholový hrozen válcovitého tvaru 10-25 cm dlouhý, hustý, mnohokvětý
Květy	fialově modrý, horní okvětní plátek přilbicový s krátkým zobákem, asi 2-3 cm dlouhý, postranní šikmo vejčité a dolní eliptické; dva korunní lístky jsou přeměněné v dlouze stopkaté, krátké ostruhové medníky pod přilbicí
Plody	mnohosemenný měchýřek
Semena	křídlatá, trojhranná
Vytrvalost	spolehlivě mrazuvzdorná
Dlouhověkost	středně dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Září
Konec doby kvetení	Říjen
Doba kvetení - poznámka	cenná pro pozdní aspekt ve výsadbách a intenzivní modrou barvu

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	při dostatku vody snáší i plné slunce, nenáročná
Faktor tepla	středně náročná
Faktor půdy	půdy humózní

Užité vlastnosti

Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	v záhonu na adekvátním stanovišti
Použití	světlé podrosty, okraje porostů, přistíněné záhony, k vodě, řez - floristika, léčivá rostlina
Růstové i jiné druhově spec..	dlouhé lodyhy natolik pevné, že nevyžadují oporu; podzimní vybarvování do žluta, celá rostlina prudce jedovatá - práce v rukavicích; k plnému vyvinutí potřebuje čas, přesazování co nejméně.
Doporučený spon pro výsad..	5 ks/m2

Množení

Množení	Předpěstování sadby
Odrůdy	'Andersii' (křížení A. carmichaelii a A. carmichaelii var. wilsonii) - cca 120 cm, 'Clody' - 60 - 80 cm, jemně bíle světle modrý květ,

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [A 1: záhon podél dřevěny, podrost pod stromy / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A \(v západní části odrostu\)](#)
- [SK 1 a: záhon nejbliž zadního vchodu do... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(sortiment LAKR na záhonu\)](#)
- [Labyrint zahrad / Unspecified \(stinná zahrada\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	A1: 'Arendsii' - XI/2017, Labyrint zahrad: 'Clody' - VI/2023
Dodavatel	A1 : Arendsii' - Botanické zahradnictví Holzbecherovi Labyrint zahrad: 'Clody' - Trvalky Semanín

Grafické přílohy





