

Taxon Vitis vinifera Milia

Název taxonu	Vitis vinifera Milia
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Mília’ (Mi)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	MTxTČ 65/4
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o slovenskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Müller Thurgau’ x ‘Tramín červený’

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, tupé
Listy	středně velké až velké, většinou trojlaločnaté, s výraznými horními výkroji a s mírně překrytým úzkým bazálním výkrojem; čepel je puchýřnatá, vespod lehce plstnatá
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký, kuželovitý, středně hustý hrozen; bobule středně velká, kulatá, žlutočervená až červenošedá
Semena	středně velká, hruškovitá, se středně dlouhým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	Pálava (Mília má větší kuželovitý hrozen)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody příliš suché i vlhké jílovité a silněji vápenité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy nejlépe vlhčí, úrodnější hlinité až hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vyšší vedení
Řez delší tažně
Podnož pro úrodné půdy SO 4 a CR 2, pro sušší půdy Kober 5BB a Kober 125AA

Užitné vlastnosti

Použití bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci střední odolnost k houbovým chorobám, citlivější k vadnutí třapiny
Plodnost pozdní, pravidelná (výnos 9-15 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízků i mikropropagací
Popis vína víno je podobné Tramínu červenému, ale méně kořenité s lehkou vůní muškátu
Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková bílá vína, cuvée

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 113\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

