

Taxon Abies cephalonica

Název taxonu	Abies cephalonica
Vědecký název taxonu	Abies cephalonica
Jména autorů, kteří taxon p...	Loud.
Český název	jedle řecká
Synonyma (zahradnicky pou..	nepoužívají se
Autor	Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Abies

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Řecko a přilehlé ostrovy, zejména ve vyšších nadmořských výškách

Zařazení

Pěstitelská skupina	Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	25-30m, koruna kuželovitá až široce kuželovitá, často s několika osami, ve stáří vytváří "čapí hnízda", středně hrubá textura
Výhony	mladé větvičky červenohnědé, lysé, lesklé
Pupeny	červenohnědé vejčité, silně pryskyřčnaté
Listy	dominuje paprscité (radiální) postavení jehlic, na zastíněných větvičkách mohou být jehlice rozčísnuté, výjimečně i dvojřadě postavené, 20-30 x 2mm velké, tuhé, ostře špičaté jehlice celkově modrozelené barvy, na líci tmavě zelené lesklé, na rubu nasivělé a s nápadnými dvěma řadami průduchů
Plody	šišťice válcovité s vyčnívajícími úzkými konci podpůrných šupin, vzpřímeně postavené, rozpadavé, o velikosti 12-20cm, pokryté pryskyřicí
Kůra a borka	v mládí hladká šedohnědá s pryskyřčnatými puchýři, později šedohnědá rozbrázděná
Možnost záměny taxonu (+..	Abies pinsapo - jehlice zřetelně kratší, radiálně postavené, i na lícové straně jehlice se souvislými řadami průduchů, šišťice bez viditelných podpůrných šupin
Dlouhověkost	středněvěká dřevina

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	již od mládí pěstovatelná na přímém slunci
Faktor tepla	vhodná pro oblasti I-II.(III.), poněkud choulostivější na silné mrazy, při nichž slabě až středně silně omrzá, někdy namrzá také při rašení (pozdní jarní mrazíky), vyžaduje chráněné a spíše teplejší polohy
Faktor vody	dobře snáší i stanoviště sušší, jedna z nejsuchovzdomnějších jedlí, rovněž na vzdušnou vlhkost poměrně nenáročná
Faktor půdy	nejlépe prosperuje na půdách bohatých na vápník, živných, dobře však prosperuje i na půdách kamenitých
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	X-III
Použití	méně používaná, ale perspektivní jedle, zvláště do městského prostředí, solitéry, skupiny
Choroby a škůdci	významější nejsou
Růstové i jiné druhově spec..	obstojně toleruje znečištěné ovzduší, v mládí poměrně rychle roste

Množení

Množení	Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka	základní druh zpravidla generativně, kultivary roubováním
Odrůdy	významější nejsou

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [BZA - Kavkaz / Botanická zahrada a arboretum Brno](#)
- [BZA - Staré arboretum - sever / Botanická zahrada a arboretum Brno](#)
- [Park - Arizona / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Formální zahrada / Zámecký park v Lednici](#)