

Taxon Malus domestica ‘Řehtáč soudkovitý’

Název taxonu	Malus domestica ‘Řehtáč soudkovitý’
Vědecký název taxonu	Malus pumila var. domestica
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	‘Řehtáč soudkovitý’
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnicky pou..	kalvil červený
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. severní Německo, stará odrůda z konce 18. století (1788)

Zařazení

Pěstitelská skupina Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vysoká, kulovitá a vzdušná koruna
Květy	velké, bílé, pravidelné
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	střední, světle žluté s červeným pruhováním, válcovité, dužnina jemné chuti, navinule sladká s kořenitou příchutí, jemná, bílá, kyprá, nažloutlá

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka pozdní, kvete bohatě

Doba zrání

Doba zrání - poznámka konec září až říjen (skladování do prosince)

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vhodná i do vyšších poloh, vysoce mrazuodolná ve dřevě i v květu
Faktor vody	nejlépe vlhké krajiny, podhůří, nehodí se do suchých půd (drobné ovoce)
Faktor půdy	v lehkých a suchých půdách rodí menší plody

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	vysokokmen, polokmen
Řez	nepotřebuje silné prořezávání

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum, transport, sušení, výroba vína
Choroby a škůdci	v mokru trpí rakovinou
Růstové i jiné druhově spec..	pomalý, ale vytrvalý
Plodnost	nízká

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka	Jedná se o chutné ovoce s více odchylnými typy. Vhodné je pro extenzivní sady i do vyšších poloh, sadů zatrávněných, méně stromořadí. Po vyžrání plodů semena v plodech "řehtají".
----------	--

Grafické přílohy



