

Taxon Vitis vinifera Veltlinske červenobile

Název taxonu	Vitis vinifera Veltlinske červenobile
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Veltlínské červenobílé’ (VČB)
Český název	réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Veltliner Rotweiss, Silberweiß, Pirosfehér Veltlini
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodrohové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	starobylá odrůda patrně rakouského původu, vznikla spontánním zkřížením odrůd ‘Veltlínské červené’ x ‘Heunisch weiss’

Zařazení

Fytoecnologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je tenší až středně silné, tmavohnědé, někdy hůře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zahrocené
Listy	středně velké až velké, výrazně pětilaločnaté s hlubokými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený; povrch listu je puchýřnatý, vespod plstnatý s obrvenou nervaturou
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký, kuželovitý, hustší hrozen s křídélky; bobule kulatá, středně velká, zelenožluté barvy, na osluněných líčkách lehce růžová, při přezrání až šedorůžová
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým a tupým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	‘Veltlínské červené rané’ a ‘Veltlínské červené’ (VČB má i ve zralém hroznu různě vybarvené bobule, bílé i červené)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš vlhké, jílovité a silněji vápenité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	nejlépe hlinité půdy, nevadí však i půdy sušší a kamenité
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý taž, snáší i krátký řez
Podnož	na hlubokých úrodných půdách SO 4 či T 5C, na lehčích půdách CR 2 či Kober 125 AA

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	nižší odolnost k houbovým chorobám, napadána obaleči
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 9-14 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit také hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	vůně vína je spíše neutrální až jemně kořenitá, chuť je sladce nahořklá s jemnou kyselinkou
Doporučená technologie vína	burčák, jakostní a přívlastková bílá vína, cuvée

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 132)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

