

Taxon Vitis vinifera Rulandske modre

Název taxonu	Vitis vinifera Rulandske modre
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Rulandské modré´ (RM)
Český název	réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Pinot noir, Blauburgunder, Roucí modré, Burgundské modré
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	starobylá odrůda pocházející pravděpodobně z Francie; pravděpodobný kříženec ´Mlynářky´ a ´Tramínu červeného´

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavě hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	malé, tupé
Listy	středně velké, okrouhlé, většinou třílaločnaté s mírnými až středně hlubokými horními výkroji, bazální výkroj je úzce otevřený, někdy překrytý; povrch listu je tmavě zelený, lehce vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý, hustý, válcovitý hrozen; bobule malá až středně velká, kulatá, tmavě modrá
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	´Rulandské bílé´ a ´Rulandské šedé´ od kterých se liší barvou bobulí (modrá, ojíňená)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	suché i příliš vlhké půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	spraše, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží, půdy s vyšším obsahem vápníku příznivě podporují tvorbu aromatických látek

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnoží	na chudších půdách Kober 125 AA i Kober 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2, SO 4 či Teleki 5C

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba růžového a červeného vína, sekty
Choroby a škůdci	citlivá zejména na houbové choroby
Plodnost	středně pozdní, pravidelná (výnos 7-11 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit také hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Odrůdy	klony PO-20, PO-22
Popis vína	víno je světle granátové až cihlové barvy, chuť jemně hořkomandlové až po sušené švestky
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, barrique, sekty

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 114)
--------------------------	---

Ostatní

Stáří vzorku	6 let
Výsev/výsadba na stanoviš...	2006

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

