

Taxon Corylus maxima

Název taxonu	Corylus maxima
Vědecký název taxonu	Corylus maxima
Jména autorů, kteří taxon p...	Mill.
Český název	líška největší
Synonyma (zahradnický pou..	C. tubulosa Willd.
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Corylus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	jihovýchodní Evropa, Malá Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vysoký keř nebo někdy i malý strom
Výhony	mladé výhony šedé, žláznatě štětinaté
Pupeny	střídavé
Listy	listy okrouhle vejčité až široce obvejčité, 7-14 cm, náhle přišpičatělé, ěx pilovité a často lehce laločnaté, báze srdčitá, řapíky 8-20 mm
Květenství	samčí jehnědy červenohnědé, 5-7 cm
Plody	plody po 1-3, listenový obal za zelena 2x delší než oříšek, za ním se zužující, trubkovitý
Semena	jedlá
Možnost záměny taxonu (+..	C. avellana
Dlouhověkost	krátkověká dřevina

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Únor
Konec doby kvetení	Duben

Doba zrání

Začátek doby zrání	Srpen
--------------------	-------

Konec doby zrání Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	není tak mrazuvzdorná jako C. avellana, oblast I-III
Faktor vody	upřednostňují vlhké půdy
Faktor půdy	hlinité půdy a dostatkem humusu

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	II-IV - květenství, dále listy
Použití	parky, města
Choroby a škůdci	dlouhonosci

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Hřížení a Roubování
---------	--