

Taxon Vitis vinifera Frumoasa

Název taxonu	Vitis vinifera Frumoasa
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Frumoasa albe´ (FA)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Belaja krasavica, Bílá krasavice
Autor	Petra Bábíková (petra_b_b_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o moldavskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Guzal Kara´ x ´Muscat de Saint-Vallier (SV 20 473)´

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	muškátová stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světleji hnědé, dobře vyzrávajíc
Pupeny	středně velké, zašpičatělé
Listy	středně velké až velké, troj až pětilaločné s mírnými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je vrásčitý, vespod štětinovitě ochmýřený
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velký, kuželovitý, středně hustý až volný hrozen; bobule je velká, mírně oválná, zelenožlutá
Semena	velká, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář
Konec doby zrání Zář

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení
Řez na dlouhý tažeň, snáší i krátký řez
Podnož na chudších půdách Kober 125 AA, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 i SO 4

Užitné vlastnosti

Použití stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci odolnější k houbovým chorobám i mrazu
Plodnost středně pozdní, pravidelná (výnos 6-11 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízků i mikropropagací
Popis vína dužnina bobule je chruplavá, šťavnatá, velmi dobré chuti s muškátovým aroma

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 133\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

