

Taxon Vitis vinifera Chrupka petrzelova

Název taxonu	Vitis vinifera Chrupka petrzelova
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Chrupka petrželová´ (CHP)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Chrupka petrželolistá, Gutedel weiss petersilie, Petersiliengutedel, Chasselas ciotat, Chasselas persil
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	původ odrůdy není přesně znám, jde pravděpodobně o mutaci z Chrupky bílé

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný růst
Výhony	jednoleté révy je středně silné až silné, tmavě hnědé, dobře vyzrávajících
Pupeny	středně velké, širší, zahrocené
Listy	středně velké, nápadně polostříhané, výrazně a hluboce vykrajované, řapíkový výkrojek je otevřený, všech pět hlavních nervů je holých, bez listové čepele; povrch listu jemně vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký hrozen, válcovitě kuželovitý, většinou poněkud volnější; bobule je středně velká, kulatá, žlutozelené barvy
Semena	oválná, středně velká, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	Chrupka bílá (nemá však stříhaný list)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře raší (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	hlinité či hlinitopísčité, vlhčí a humóznější půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA či CR 2, do hlubších a úrodnějších půd pak SO 4 či T 5C

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	po dobu vegetace - stříhaný list
Použití	bílá stolní odrůda - přímý konzum, dekorativní vzhled
Choroby a škůdci	střední až vyšší odolnost k houbovým chorobám
Plodnost	středně pozdní, pravidelná (výnos až 5-8 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je chruplavá až rozplývavá, sladká, šťavnatá, neutrální chuť
Doporučená technologie vína	burčák, stolní lehké víno

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 103)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

