

Taxon Prunus armeniaca ‘Tomcot’

Název taxonu	Prunus armeniaca ‘Tomcot’
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Tomcot’
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Kanada
-------------------------------	--------

Zařazení

Fytocenologický původ	rodokmen neznámý
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně vzrůstná, bujná, koruna rozložitá
Květy	růžové, nápadné, voňavé, středně velké až velké
Opylovací poměry	Částečně samosprašná
Plody	středně velké, oblé, světle oranžové s jemným líčkem na osluněné části plodu, pevné, dužnina sladká, velmi aromatická, velmi kvalitní, dobrá odlučitelnost

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	středně raná
-------------------------	--------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	začátek července, 10 až 12 dnů před ‘Velkopavlovická’
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	odolnost ve dřevě proti mrazům i květů proti pozdním jarním mrazíkům v době květu je na střední až dobré úrovni
Faktor půdy	nenáročná na stanoviště, vyhovují jí hlinito-jílovité, písčité půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Podnož lze použít všechny

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum, sušení, univerzální
Plodnost	středně brzká, vysoká, pravidelná, začíná od 3-5 roku po výsadbě

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Grafické přílohy

