

Taxon Asplenium antiquum

Název taxonu	Asplenium antiquum
Vědecký název taxonu	Asplenium antiquum
Jména autorů, kteří taxon p...	Makino (1929)
Český název	sleziník
Synonyma (zahradnický pou..	Neottopteris antiqua (Makino) Masam.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Neottopteris

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Japonsko, ostrovy Riukiu, Taiwan

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka polostálozelená a Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Epifyt
Životní forma - poznámka	v tropech epifytické, v kultuře možno pěstovat i terestericky

Popisné a identifikační znaky

Habitus	bazální listová růžice, široce nálevkovitá, výška cca 30-40 cm
Kořen	krátký vzpřímený oddenek, pokrytý na povrchu černými plevinami
Listy	jsou zřetelněji řapíkaté než u A. nidus, celistvé, kopinaté, 50-80 cm dlouhé, celokrajné, na vrcholu výrazněji špičaté a se silně zvlněným okrajem; žilnatina je tvořena souběžnými postranními žilkami;
Semena	výtrusy; kupky výtrusnic jsou natěsnané do čárkovitých útvarů, lemujících postranní žilky a začínají cca 5 mm od středního nervu; nezralé výtrusnice jsou kryty později zasychající ostřou, která je dvakrát širší než u A. nidus.
Možnost záměny taxonu (+..	A. nidus - větší vzrůst, nezvlněný okraj listu.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	stanoviště s rozptýleným světlem; nesnáší přímé slunce
Faktor tepla	teplý skleník; v létě 18-20°C, přes zimu minimální teploty 14-16°C
Faktor vody	vyžaduje vyšší půdní i vzdušnou vlhkost;
Faktor půdy	živný a lehký substrát, s přidavkem rašeliny; pH 4,5 - 6,0

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden - prosinec
Použití	solitéra pro epifytní kmeny a pro podrosty teplých skleníků; při zvýšené péči (vyšší vzdušná vlhkost) lze omezeně pěstovat i v otevřeném interiéru (koupelny, kuchyně).
Choroby a škůdci	kořenové mšice, puklice

Množení

Množení	Generativní a Předpěstování sadby
Množení - poznámka	rodozměna: výsev výtrusů - prothallium - oplození - mladé rostliny
Odrůdy	‘Osaka’ - kompaktní listová růžice s černým středem, mladé listy jsou silně zvlněné, matně zelené s lehkým leskem; ‘Victoria’ - vzrůstný kultivar se silně zvlněným okrajem listu

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/26603318?tab=references>

Grafické přílohy

