

Taxon Vitis vinifera Dekabrskij

Název taxonu	Vitis vinifera Dekabrskij
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Děkabrskij’ (Dek)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Děkabrenskij
Autor	Petra Bábíková (petra_b_b_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o moldavskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Coama neagra’ x ‘Villard Blanc (SV 12 375)’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	modrá stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zašpičatělé
Listy	středně velké, nejčastěji třílaločné s mírně hlubokými horními výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu spíše hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	menší až středně velký hrozen, kuželovitě válcovitý, křídlatý, volnější; bobule je velká, podlouhle oválná, tmavě modrá s ojíněním
Semena	velká, s kratším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře raší (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Říjen
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody příliš suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení
Řez na dlouhý tažen i delší čípky
Podnož na chudších půdách Kober 125 AA či 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 či SO 4

Užitné vlastnosti

Použití stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci odolná k houbovým chorobám i mrazu
Plodnost pozdní, pravidelná (výnos 5-8 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína dužnina bobule je masitá, v chuti neutrální

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 129\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf