

Taxon Vitis vinifera Frankovka

Název taxonu	Vitis vinifera Frankovka
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Frankovka´ (Fr)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Blaufränkisch, Blauer Limberger, Lemberger, Shirokolistyj, Kék Frankos, Crna Moravka
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	velmi stará odrůda, dle některých pramenů pochází z Německa či Rakouska popř. Chorvatska; spontánní kříženec odrůdy ´Heunisch weiss´ s doposud nezjištěnou odrůdou

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je světle červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, široké, špičaté
Listy	velké, jemně trojlaločné až celistvé, bazální výkroj je tvaru písmene V, mírně otevřený; povrch listu je tmavě zelený, hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký, kuželovitý, středně hustý hrozen; bobule je středně velká, kulatá, tmavě modré barvy
Semena	středně velká, hruškovitá až elipsoidní, zobáček je krátký
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Říjen
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody méně vhodné jsou sušší a kamenité půdy
Faktor půdy hlinité, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení
Řez na dlouhý tažň
Podnož doporučovány jsou podnože SO 4, T 5C a CR 2

Užitné vlastnosti

Použití modrá moštová odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci náchylná k houbovým chorobám
Plodnost pozdní, pravidelná (výnos 9-14 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Odrůdy klony PO-22/4, PO-275/5i, PO-281/E, PO-271/B, VP-6/5, VP-14/4, VP-11/3
Popis vína víno je tříslovité, odrůdové chuti ovocného charakteru po višních, skořici a hořké čokoládě
Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková červená vína, rosé

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 89, 115\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

