

Taxon *Prunus persica* 'Cresthaven'

Název taxonu	<i>Prunus persica</i> 'Cresthaven'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus persica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Batsch
Odrůda	'Cresthaven'
Český název	broskvoň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	nemá
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	USA, Michigan, r. 1963
-------------------------------	------------------------

Zařazení

Fytocenologický původ	křížení 'Kalhaven' x 'South Haven 309'
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vznosné, středně husté až husté koruny
Pupeny	listové jsou středně velké, dlouze vejčité, středně odstávají; květní jsou středně velké, kulovitě vejčité, mírně odstávají
Listy	velké, široké, zvlněné
Květy	malé (průměr 15 mm), zvonkovité, korunní plátky oválné, tmavě růžové, na bázi fialové, čnělka v úrovni prašníků, kvete bohatě
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velké až velké (140-170 g), kulovité, nesouměrné, slupka pevná, značně plstnatá, dobře loupatelná, základní barva je žlutavě zelená, z větší části překrytá líčkem zářivě červené barvy, dužnina tuhá, jemně zmitá, rozplývavá, šťavnatá, navinulá, aromatické dobré chuti, barva dužniny je žlutá, kolem pecky mírně načervenalá, dobrá odlučitelnost, pravá broskev
Možnost záměny taxonu (+..	Vzrůst, květ, znaky a vlastnosti plodu, doba zrání.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	středně pozdní, od 18. 4. do 24. 4.
-------------------------	-------------------------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka 26-30 den po 'Redhaven'

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	nenáročná, plastická odrůda
Faktor půdy	vyžaduje půdy středně těžké, hlinité, dobře zásobené vláhou

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	nejvhodnější je zákrsek s kotlovitou korunou
Řez	bez zvláštních nároků, snáší středně hluboké zmlazení
Podnož	doporučuje se broskvoňový semenáč typů B-VA-1 až B-VA-4 a broskvomandloň BM-VA-1

Užitné vlastnosti

Použití	konzum
Choroby a škůdci	průměrně náchylná na kadeřavost broskvoní
Růstové i jiné druhově spec..	bujný růst
Plodnost	nastupuje 3. rokem po výsadbě, vysoká, pravidelná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad
--------------------------	--

Ostatní

Poznámka	Málo náročná odrůda na stanoviště a ošetřování, velmi plodná, dávající pěkné kvalitní plody, je použitelná do všech oblastí vhodných pro pěstování broskvoní. Uplatňuje se jak v tržním ovocnářství, tak i v zahrádkách.
----------	--

Grafické přílohy

